Les Biopesticides : une recherche fondamentale vers une valorisation industrielle

Mireille Kallassy Awad

Professeur associé

*Faculté des sciences
Université Saint- Joseph*

Le 8 février 2012

La bactérie *Bacillus thuringiensis*

- ❖ Bactérie GRAM +
- ❖ Sporulante
- ❖ Isolée du sol, des insectes, de la poussière...
- ❖ Phase stationnaire du cycle de croissance → formation d'une inclusion cristalline- delta endotoxines ou toxines Cry

Bacillus thuringiensis vu au microscope contraste de phase.

L'inclusion cristalline

- Responsable de la toxicité des insectes
- Ce sont des protoxines actives contre un ordre et un groupe bien particulier d'insectes: diptères, lépidoptères, coléoptères et autres
- Une inclusion cristalline d'une souche quelconque: plusieurs protéines *Cry*
- Codées par les gènes *cry* localisés sur des plasmides conjugatifs

Photos showing the protein inclusions of Bt viewed by electronic microscopy of the following strains ;
a :HD1, b :Lip, c :B255, d :D6, e : D28, f: D33.

Microscopie électronique à transmission des cristaux des
souches de *Bacillus thuringiensis* isolées du sol libanais

Les familles des gènes cry

The largest
encoding 130-138 KDa

Classes	cry genes	Crystalline inclusion	Insecticidal Activity	Bt Reference species
<i>cry 1</i>	A (Aa, Ab, Ac) B C D E F G I	Bipyramidal	Lepidopteran	<i>kurstaki</i> <i>aizawa</i>
<i>cry 2</i>	A B C	Cubique	Lepidopteran and dipteran	<i>kurstaki</i>
<i>cry 3</i>	A B	Irrégulière	Coleopteran	<i>tenebrionis</i>
<i>cry 4</i>	A B C D	Irrégulière	Dipteran	<i>israelensis</i>
<i>cry 5- cry 6</i>			Nematode	<i>jordanica</i>

Mécanisme d'action des protéines de la famille des Cry1 chez les Lépidoptères

Structure des protéines Cry1

- **3 domaines:**

- Domaine I :

- » 6 hélices α + 1 hélice α centrale
 - » Responsable de la formation du pore membr
 - » résidus chargés négativement 33..... 253

- Domaine II:

- » 3 feuillets β antiparallèles
 - » résidus chargés positivement 265...461

- Domaine III:

- » 2 feuillets β antiparallèles
 - » résidus chargés positivement 463 ... 609

– Régions exposées des domaines II et III → fixation au récepteur et insertion dans la membrane

- Présence de boucles entre ces différents domaine

Cry1Aa

Craig R. Pigott and David J. Ellar Rôle of Receptors in *Bacillus thuringiensis* Crystal Toxin Activité: MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS, June 2007, p. 255–281

- B.t. a été enregistré aux Etats-Unis pour une utilisation comme pesticide en 1961 et réenregistré en 1998*

Utilisation en agriculture biologique

- ❖ Pesticides chimiques sont dangereux.
- ❖ Bt est une alternative et est sélectif

120 souches différentes sont isolées du sol libanais

* Schnepf, E.; Crickmore, N.; Van Rie, J.; Lereclus, D.; Baum, J.; Feitelson, J.; Zeigler, D. R.; Dean, D. H. *Bacillus thuringiensis* and Its Pesticidal Crystal Proteins. *Microbiol. Molecular Biol.* **1998**, 62, 775-806.

Global Biopesticide Market

\$260MM estimated 2005 Sales
Projected to grow to \$350–\$400MM by 2015

Bt **Bacterial** **Virus** **Fungal** **Nematode**

Source: CPL Business Consultants, July 2006

Toxicité de *B. thuringiensis*

- * Il est pratiquement non toxique pour les oiseaux et les poissons.
- * Une toxicité très minimale aux abeilles (Il faut suivre les consignes d'application)
- * A été testé sur les animaux et les hommes (par ingestion et inhalation).

Que devient *Bacillus thuringiensis* dans l'environnement?

- * Sur les surfaces végétales les produits de B.t. se dégradent rapidement (1).
- * B.t. est modérément persistant dans le sol et ses toxines se dégradent rapidement (2, 3).
- * B.t. n'est pas originaire de l'eau et n'est pas susceptible de se multiplier dans l'eau (3).

1. *Reregistration Eligibility Decision Document: Bacillus thuringiensis*; EPA-738-R-98-004; U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, U.S. Government Printing Office: Washington, DC, March 1998.

2. Kamrin, M. A. *Pesticide Profiles: Toxicity, Environmental Impact, and Fate*; CRC: Boca Raton, FL, 1997; pp 535-539.

3. World Health Organization. *Bacillus thuringiensis*, Environmental Health Criteria, 217. Geneva, Switzerland, 1999.

Indépendamment des **delta-endotoxines**, *B. thuringiensis* produit des métabolites extracellulaires :

• VIP (Vegetative Insecticidal Proteins)

← • Les bactériocines

• Les β -lactamases

← • Les chitinases

Historique

Situation actuelle de la recherche sur les BIOPESTICIDES

Situation actuelle des BIOPESTICIDES à l'échelle industrielle

Cibles testées de la souche Lip

Helicoverpa armigera
Pyrale des choux

Thaumetopoea pityocampa
Processionnaire du pin

Prays Olea
Teigne de l'olivier

Ephestia kuehniella
Teigne de la farine

« Des biopesticides pour une alimentation plus saine au Liban » (juin 2011-décembre 2014)

Le projet comporte deux objectifs majeurs:

- le développement d'une production libanaise de biopesticides, en vue d'éviter l'importation et de réduire les coûts de ces produits ;
- la diffusion de l'utilisation des biopesticides dans les communautés d'agriculteurs au Liban.

Organisation

Spin
off

aec

**Recherche et
développement**
USJ+*aec*

- * Construction et mise en place
- * Optimisation de la production
- * Production

Production
***aec* + USJ + Deir
Tanail**

- * Marketing du produit final
- * Enregistrement
- * Autorisation

Marketing
aec

USJ

- * Recherche de souches
- * Caractérisation moléculaire
- * Tests et Recherche sur le fermenteur de 5 Litres
- * Préparation des précultures pour inoculer les grands fermenteurs

aec

- * Essais sur le terrain
- * Sensibilisation des agriculteurs

Culture de *B. thuringiensis* vers le scale up

$$V = 0.05 * V \text{ milieu simple/DO}$$

Fermenteur de 1000
Litres, 3 Jours, 30°C

Fermenteur de 100
Litres, 1 nuit, 30 °C

Milieu complet:
3 litres
T: 30 °C, une nuit
Sous agitation

Fermenteur de 5 Litres

Photos du fermenteur de 5L

Photos des sessions de sensibilisation données par *aec* aux agriculteurs

aec

Akkar

Kfarmabrakh

Marjehyoun

participer au développement

Remerciements

Les collègues de l'USJ

- *M. Georges Aoun*
- *M. Joseph Mezher*
- *M. Toufic Rizk*
- *M. Dominique Salameh*
- *M. Nicolas Louka*
- *Les collègues de la FS*

*L'équipe de **aec***

- *M. Pierre Issa*
- *M. Fady Moujaes*
- *Loubna, Olivia, Abdo, Roland....*

Conseil de la recherche de l'USJ

aec

Collaborateurs

-Collaborateurs en France

-INRA La minière: Unité Génétique Microbienne et Environnement:

- Christina Nielsen Leroux
- Didier Lereclus
- Vincent Sanchis

-Laboratoire Ecologie Microbienne des Insectes et interactions hôte-Pathogène, Montpellier 2

- Alain Givaudan
- Sophie Gaudriault

-L'Institut Charles Gerhardt Montpellier UMR 5253

- Joel Chopineau

-L'Institut Polytechnique de Toulouse

- Pierre Streihanno
- Cedric Brandam

-Collaborateurs en Tunisie

Centre de Biotechnologie de Sfax

ERI de Biotecnología y Biomedicina

Departamento de Genética, Fac. CC. Biológicas

- Slim Tounsi
- Samir Jaoua
- Souad Rouis
- Nabil Zouari

- Collaborateur en Algérie

Faculté de science à Tlemcen

- Faiza Elias

-Collaborateur en Espagne

ERI de Biotecnología y Biomedicina

Departamento de Genética, Fac. CC. Biológicas

Universitat de València

- Juan Ferre

-Collaborateur aux USA

State University of New York, at Postdam

- Fady Abdallah

acc

Merci pour votre attention